

AQUABAC DF3000

LARVICIDE BIOLOGIQUE ACTIF CONTRE LES MOUSTIQUES, À BASE DE BTI

Présentation

Apparence : granulés blanchâtres dispersibles après délitage et dispersion dans l'eau.

Substance active : 43 % *Bacillus Thuringiensis* subspecies *Israelensis*, ≥ 3000 UTI/mg ; Sérotype H-14.

Mode d'action : agit par ingestion au stade larvaire.

Cibles : moustiques du genre *Culex*, *Aedes* et *Anophèles*.

Usage : Strictement professionnel.

Points forts

- Larvicide biologique.
- Très haute concentration en matière active.
- Idéal pour traiter les milieux aquatiques sensibles (plans d'eau, bassins, etc.).

Lieux d'application

Les gîtes larvaires, partout où l'eau stagne, sur de grandes surfaces (zones de terre inondable, lacs, étangs, marais etc) ; sur de petites surfaces (récipients divers, piscines, fossés, vides sanitaires, etc), dans les zones rurales ou urbaines.

Dose et mode d'emploi


Doses d'utilisation : AQUABAC DF3000 s'utilise à la dose de 1 kg/ha après dispersion dans l'eau, sur l'ensemble de la surface où la présence de larves de moustiques a été constatée.

Conditions d'utilisation : AQUABAC DF3000 s'utilise après dispersion dans l'eau (application de bouillie extemporanée). La quantité d'eau dépend du type de matériel utilisé. Le taux de dilution peut varier de 12 à 25% pour les traitements manuels ou motorisés à dos ; de 1% à 15% pour les traitements à l'aide de pulvérisateurs à jets portés montés sur véhicules motorisés ; de 6% (BV) à 40% (UBV) pour les systèmes d'épandage aériens montés sur aéronef.

Dans tous les cas, veiller à traiter les surfaces avec une quantité d'eau suffisante pour assurer une application homogène. Maintenir le mélange en agitation pendant l'application.

Fréquence d'application : le nombre d'application(s) par an varie selon les mises en eau (précipitations, mise en eau artificielle), les taux d'infestation, les surfaces à traiter, etc. Dans la plupart des cas, le nombre d'application varie de 1 à 6 par an.

Respecter un intervalle de 5 jours entre chaque application et contrôler la présence des larves de moustiques avant l'application.



Référence et conditionnement

Réf. I7139 : Pot de 500g - Carton de 12 unités

Précautions d'emploi

Stockage :

Conserver hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. Conserver dans un endroit sec et frais où la température ne dépasse pas 20°C.

Manipulation :

TP18. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Respecter les instructions d'utilisation. Consulter impérativement la fiche de données de sécurité disponible gratuitement sur simple demande à l'adresse suivante : fds@lodi.fr.