

PHOBI

FICHE TECHNIQUE

FENOX EC

SPECIAL LIEUX SENSIBLES

IDEAL PUNAISES DE LIT ET ACARIENS
HYGIENE GENERALE - ÉLEVAGE - ORDURES ET DECHETS
LOCAUX POA/POV denrées emballées

Formulation


| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Composition | Etofenprox 300g/L / Pyrèthre 1g/L |
| Type de formulation | Concentré émulsionnable |
| Utilisateurs | Strictement professionnels |

Points forts

LARGE SPECTRE D'ACTION : efficacité prouvée sur insectes volants (mouches, moustiques...), insectes rampants (blattes, fourmis, puces...), acariens de la poussière et agents de la gale, punaises de lit, mais aussi insectes des denrées stockées (triboliums, pyrales, capucins, lasiodermes, dermestes, charançons...)

TRAITEMENTS MÊME DANS LES LIEUX LES PLUS SENSIBLES

- habitations, bureaux, écoles, cabinets médicaux et autres lieux accueillant du public
- locaux de stockage des produits d'origine animale ou végétale (POA/POV)
- locaux contenant des denrées emballées (POA/POV)
- locaux et matériel d'élevage
- locaux ordures et déchets



*DL50 = Dose létale pour 50% des rats testés.
Plus la DL50 est élevée, moins la substance est dangereuse pour les mammifères.

- Action choc et longue remanence (jusqu'à 3 mois) sur matériaux poreux et non poreux
- Alternative dans les cas de résistance aux autres pyréthrinoïdes classiques
- Etofenprox 300g/l + co-formulants non classés = la puissance du concentré alliée à une formulation non-agressive



Références & Conditionnements

Réf. I8150 : Flacon doseur de 500mL
Réf. I8151 : Doses de 25mL par 10 dans un coffret hermétique

Précautions particulières

Utiliser les insecticides avec précaution. Avant tout utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Précautions d'utilisation :

Évacuez les personnes, les animaux (y compris les aquariums et les terrariums) et les denrées alimentaires de la zone à traiter.

Prenez garde au matériel électronique et aux surfaces sensibles, par mesure de précaution, faire un essai dans un coin dérobé avant d'effectuer la totalité du traitement.

Éliminer le produit non utilisé et son emballage conformément à la réglementation en vigueur. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau. Ne pas réutiliser l'emballage.

Il est conseillé de porter des gants et de se laver les mains après chaque utilisation.

Pour les instructions de premiers secours, contacter le centre antipoison le plus proche.

Stockage : Conservez hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

Conserver dans l'emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage.

FENOX EC

SPECIAL LIEUX SENSIBLES

IDEAL PUNAISES DE LIT ET ACARIENS
HYGIENE GENERALE - ÉLEVAGE - ORDURES ET DECHETS
LOCAUX POA/POV denrées emballées



Mode d'emploi

Pulvérisation de surface :

Pulvériser le produit après l'avoir dilué dans l'eau à la dose préconisée (voir tableau ci-dessous). Pulvériser tous les endroits fréquentés par les insectes (murs, sols, encadrements de fenêtres, tapis, matériels, litières...). Aérer pendant tout le traitement puis ventiler à fond avant de réoccuper les lieux.

Traitement de volume et spatial :

Le produit peut s'utiliser en nébulisation à froid ou à chaud. Afin d'obtenir une efficacité optimale du produit, fermer toutes les issues de la zone ou du local à traiter (portes, portails, fenêtres et autres ouvertures...).

Nébuliser le produit à la dose préconisée (voir tableau ci-dessous). Régler le débit. Diluer dans l'eau si besoin : le volume d'eau dépendra du type d'appareil utilisé (à titre indicatif, diluer à 25% avec un nébulisateur du type Swing Fog). Quitter la zone traitée et laisser agir 4 à 6h pour une efficacité optimale. Ventiler à fond avant de réoccuper les lieux (durée d'aération variable selon le niveau de ventilation et la taille du local : 30min à 2h).

Comme pour tout traitement de volume, le port de la combinaison intégrale jetable, d'un masque panoramique, de gants et de bottes est obligatoire.

Dans le cadre d'un traitement de volume d'un local contenant des denrées emballées, celle-ci doivent être conditionnées dans un suremballage carton. Respecter les dilutions et les doses d'emploi. Dans les locaux d'élevage, bien insister dans les angles et autour des ouvertures des bâtiments.

Doses d'emploi

| | TRAITEMENT DE SURFACE | TRAITEMENT DE VOLUME* |
|--|---------------------------------------|--|
| HYGIENE GENERALE | | |
| Moustiques | 50mL dans 5L d'eau /100m ² | 50mL / 1000m ³ 30 à 60ml / 1ha |
| Autres insectes | 50mL dans 5L d'eau /100m ² | 200mL / 1000m ³ |
| LOCAUX DE STOCKAGE, IAA, BOULANGERIES, SUPERMARCHES, ABATTOIRS... | | |
| Locaux de stockage POA/POV | 50mL dans 5L d'eau /100m ² | / |
| Locaux contenant des denrées emballées (POA/POV) | 50mL dans 5L d'eau /100m ² | 200mL / 1000m ³ 400mL/1000m ³ en cas d'infestation de blattes |
| Matériel de transport et de stockage des POA/POV | 50mL dans 5L d'eau /100m ² | / |
| ELEVAGE | | |
| Logements d'animaux domestiques | 50mL dans 5L d'eau /100m ² | / |
| Matériel d'élevage | 50mL dans 5L d'eau /100m ² | / |
| Matériel transport animaux domestiques | 50mL dans 5L d'eau /100m ² | / |
| Locaux de préparation de nourriture | 50mL dans 5L d'eau /100m ² | / |
| ORDURES ET DECHETS, LOCAUX POUBELLES, DECHETTERIES, VIDE-ORDURES, CAMIONS BENNES... | | |
| Locaux utilisés pour le traitement | 50mL dans 5L d'eau /100m ² | / |
| Matériel de collecte | 50mL dans 5L d'eau /100m ² | / |
| Matériel de transport | 50mL dans 5L d'eau /100m ² | / |

* dilution dans l'eau selon le matériel utilisé, à titre indicatif, dilution à 25% dans de l'eau pour une utilisation avec un appareil de type Swing Fog